

Таблица 1. Вопросы PICO

Вопрос PICO	Характеристика исследования	Критерии включения
Вопрос PICO 1: рентгенологическое исследование грудной клетки плюс клиническое заключение или только клиническое заключение	Пациент	Взрослые амбулаторные пациенты с острым кашлем и подозрением на пневмонию
	Вмешательство	Рентгенологическое исследование грудной клетки плюс клиническое заключение
	Сравнение	Только клиническое заключение
	Результат	Первоначальный результат: доля участников, которые не были излечены или их состояние существенно не улучшилось при дальнейшем наблюдении
Вопрос PICO 2: уровни прокальцитонина или СРБ или только симптомы	Пациент	Взрослые амбулаторные пациенты с острым кашлем и подозрением на пневмонию
	Вмешательство	Уровни прокальцитонина или СРБ плюс симптомы
	Сравнение	Только симптомы
	Результат	Подтверждение наличия пневмонии или его исключение
Вопрос PICO 3: диагностический алгоритм плюс клиническое заключение или только клиническое заключение	Пациент	Взрослые амбулаторные пациенты с острым кашлем и подозрением на пневмонию
	Вмешательство	Диагностический алгоритм, правило клинической оценки в дополнение к клиническому заключению
	Сравнение	Только клиническое заключение
	Результат	Подтверждение наличия пневмонии или его исключение
Вопрос PICO 4: микробиологическое исследование плюс клиническое заключение или только клиническое	Пациент	Взрослые амбулаторные пациенты с острым кашлем и подозрением на пневмонию
	Вмешательство	Микробиологические исследования, такие как культуральное, серологическое и ПЦР-тестирование

<p>заключение</p> <p>Вопрос PICO 5: применение или не применение антибиотиков при подозрении на пневмонию</p> <p>Вопрос PICO 6: симптоматическая терапия плюс антибиотики или только антибиотики</p> <p>Вопрос PICO 7: защищенные или незащищенные антибиотики</p>	Сравнение	Только клиническое заключение
	Результат	Подтверждение причины пневмонии
	Пациент	Взрослые амбулаторные пациенты с острым кашлем и подозрением на пневмонию
	Вмешательство	Применение антибиотиков
	Сравнение	Неприменение антибиотиков
	Результат	Первоначальный результат: доля участников, которые не были излечены или их состояние существенно не улучшилось при дальнейшем наблюдении
	Пациент	Взрослые амбулаторные пациенты с острым кашлем и подозрением на пневмонию
	Вмешательство	Противокашлевые средства, муколитики, системные кортикостероиды, ингаляционные кортикостероиды, антихолинергические средства, НПВП, витамины С и D плюс антибиотик
	Сравнение	Только антибиотик
	Результат	Первоначальный результат: доля участников, которые не были излечены или их состояние существенно не улучшилось при дальнейшем наблюдении
Пациент	Взрослые амбулаторные пациенты с острым кашлем и подозрением на пневмонию	
Вмешательство	Защищенные антибиотики	
Сравнение	Незащищенные антибиотики	
Результат	Первоначальный результат: доля участников, которые не были излечены или их состояние существенно не улучшилось при дальнейшем наблюдении	

<p>Вопрос PICO 8:          Применение или неприменение          противовирусной терапии при          подозрении на пневмонию во          время сезона гриппа.</p>	Пациент	Взрослые амбулаторные пациенты с острым кашлем и подозрением на пневмонию во время сезона гриппа
	Вмешательство	Применение противовирусной терапии
	Сравнение	Неприменение противовирусной терапии
	Результат	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доля пациентов, которым была назначена антибактериальная терапия</li> <li>2. Доля пациентов, получающих амбулаторное лечение</li> <li>3. Доля пациентов, нуждающихся в скорой медицинской помощи</li> <li>4. Доля госпитализированных пациентов</li> <li>5. Доля пациентов с летальным исходом</li> <li>6. Доля пациентов, у которых проявляются неблагоприятные побочные явления (например, тошнота, сонливость и т. д.)</li> </ol>

СРБ = С-реактивный белок; НПВП = нестероидный противовоспалительный препарат; ПЦР = полимеразная цепная реакция; PICO = пациент, вмешательство, сравнение, исход.