

Приложение. Таблица 4. Сравнение диагностических подходов, включая анализ биомаркеров, систематическую и прицельную биопсию предстательной железы с использованием подстановки данных.

Данные о результатах систематической биопсии были вменены для мужчин с полными данными по тесту Stockholm-3 (n = 675) с использованием теста в качестве предиктора вероятности исхода.

Условные обозначения: сравнение с использованием второго подхода в качестве референтного (столбец 1). RS - относительная чувствительность.

Все центры, подстановка данных	Количество биопсий с использованием сравниваемых подходов	Процент биопсий, сравнение подходов	Чувствительность, градация ≥ 2	Чувствительность, градация 1
	n / n	% (95% ДИ)	RS (95% ДИ)	RS (95% ДИ)
Прицельная в ср. с систематической	503 / 675	75 (71; 78)	1,03 (0,95; 1,14)	0,69 (0,59; 0,83)
S3M + систематическая в ср. с систематической	374 / 675	55 (51; 59)	0,92 (0,88; 0,96)	0,66 (0,57; 0,74)
S3M + прицельная в ср. с систематической	324 / 675	48 (44; 51)	0,95 (0,87; 1,05)	0,46 (0,37; 0,57)
MPT/прицельная + систематическая биопсия у мужчин с положительным S3M	374 / 675	55 (51; 59)	0,91 (0,87; 0,95)	0,62 (0,51; 0,69)
S3M + прицельная в ср. с прицельной	324 / 503	64 (60; 68)	0,92 (0,89; 0,96)	0,66 (0,58; 0,74)
S3M + прицельная в ср. с S3M + систематическая	324 / 374	87 (83; 90)	1,03 (0,94; 1,15)	0,70 (0,56; 0,83)