

ФИО**Пол:** Жен**Возраст:** 44 года

ИНЗ: 999999999

Дата взятия образца: 25.07.2024 07:00

Дата поступления образца: 25.07.2024 14:20

Врач: 26.07.2024 15:28

Дата печати результата: 26.07.2024

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
АТ к бета-2-гликопротеину 1, IgG+A+M	7.00	Ед/мл	<10	Тест-система: Anti-beta-2-Glycoprotein I Screen, ORGENTEC
АТ к кардиолипину, Ig G	6.00	GPL-Ед/мл	<10	< 10 GPL-Ед/мл - Отрицательные >= 10 GPL-Ед/мл - Положительные Тест-система: Anti-Cardiolipin IgG/IgM, ORGENTEC
АТ к кардиолипину, Ig M	3.00	MPL-Ед/мл	<7	< 7 MPL-Ед/мл - Отрицательные >= 7 MPL-Ед/мл - Положительные Тест-система: Anti-Cardiolipin IgG/IgM, ORGENTEC

Исполнитель Аксенова А.В., Врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:

Отсутствие антител к кардиолипину класса IgM снижает вероятность диагноза антифосфолипидного синдрома (АФС).
Отсутствие антител к кардиолипину класса IgG снижает вероятность диагноза антифосфолипидного синдрома (АФС).
Отсутствие антител к бета-2 гликопротеину 1 (бета-2ГП) при отсутствии антител к кардиолипину и волчаночного антикоагулянта исключает диагноз антифосфолипидного синдрома (АФС). Для исключения иммуноопосредованной патологии свертывания рекомендуется также исследование антител к протромбин-фосфатидилсерину (PS-PT).

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача