

ФИО

Пол:	Муж
Возраст:	22 года
ИНЗ:	999999999
Дата взятия образца:	25.02.2020 11:25
Дата поступления образца:	25.02.2020 23:16
Врач:	04.03.2020 21:19
Дата печати результата:	01.12.2020 13:23

Исследование

Заключение

Отсутствие антител к белку VP230 значительно снижает вероятность диагноза буллезного пемфигоида, однако не исключает наличие другой формы буллезного дерматоза или аутоиммунного поражения кожи. Антитела к белку VP 230 выявляют у 30-60% пациентов с буллезным пемфигоидом, реже отмечаются при других его формах. Окончательно диагноз подтверждается с помощью биопсии и гистологического исследования материала.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта <http://www.invitro.ru/> с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Муж
Возраст: 22 года
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 25.02.2020 11:25
Дата поступления образца: 25.02.2020 23:16
Врач: 04.03.2020 21:19
Дата печати результата: 01.12.2020 13:23

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
АТ к белку VP230, IgG	5.00	ед/мл	<20

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта <http://www.invitro.ru/> с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача