

ФИО**Пол:****Жен****Возраст:****6 лет**

ИНЗ:

999999999

Дата взятия образца:

30.07.2020 12:58

Дата поступления образца:

31.07.2020 08:37

Врач:

07.08.2020 17:56

Дата печати результата:

06.11.2020 15:48

Исследование

Заключение

Повышенные уровни неоптерина (НПТ) сыворотки крови возникают при активации клеточного иммунитета под действием интерферона-гамма. Основными причинами увеличения сывороточных уровней являются генерализованные вирусные инфекции (гепатиты, ВИЧ), туберкулез, и других гранулематозные инфекции, иммунные реакции при отторжении трансплантата, болезнь трансплантат против хозяина, аутоиммунные заболевания, включая активную СКВ, ревматоидный артрит, аутоиммунные заболевания печени и воспалительные заболевания кишечника, саркоидоз и системные васкулиты. Неоптерин также может быть повышен при травме и ожогах. Обычно концентрация неоптерина остается в норме при местных и системных бактериальных инфекциях.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта <http://www.invitro.ru> с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО**Пол:****Жен****Возраст:****6 лет**

ИНЗ:

999999999

Дата взятия образца:

30.07.2020 12:58

Дата поступления образца:

31.07.2020 08:37

Врач:

07.08.2020 17:56

Дата печати результата:

06.11.2020 15:48

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Неоптерин	10.50*	нмоль/л	<10

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта <http://www.invitro.ru> с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача